

Incidence par localisation sur la période 2012-2014

TABLE 1 – Incidence par localisation selon le sexe (moyenne sur la période)

Localisation	Femmes		Hommes	
	Cas	TIs	Cas	TIs
Lèvre - Cavité buccale - Pharynx	71	5.9	258	26.4
Oesophage	29	1.8	108	10
Estomac	52	3.2	92	7.8
Intestin grêle	13	0.9	17	1.6
Côlon - rectum	368	24.4	433	37
Foie	30	1.8	213	19
Vésicule et voie biliaire	29	1.5	18	1.5
Pancréas	105	6.6	113	10.1
Larynx	15	1.2	62	6.1
Poumon	207	17	512	48.1
Plèvre	7	0.4	20	1.6
Mélanome de la peau	152	14.4	144	14
Sein	1116	101.2	14	1.3
Col de l'utérus	46	5	-	-
Corps de l'utérus	135	9.9	-	-
Ovaire	101	7.5	-	-
Prostate	-	-	970	88
Testicule	-	-	50	7.1
Vessie	43	1.8	166	13.5
Rein	88	6.6	158	14.7
Système nerveux central	42	4.2	60	6.3
Thyroïde	129	15.2	42	4.8
Lymphome de Hodgkin classique	15	2.1	28	4
LLC / lymph. lymphocytaire	36	2.4	48	4.1
LNH folliculaire	31	2.4	30	3
LNH diffus à grandes cellules B	48	3.7	54	5.2
LNH du manteau	5	0.2	12	1
LNH de la zone marginale	16	1.1	21	1.9
Myélome / Plasmocytome	43	2.6	45	3.8
LLP / Maladie de Waldenström	17	1	42	3.3
LNH T/NK à cellules matures	12	1.1	21	2
LNH / leucémie lymphoblastique	12	2.2	11	1.9
Leucémie aiguë myéloïde	25	2.2	29	2.6
Leucémie myéloïde chronique	9	0.9	11	1.3
Autres SMP chroniques	34	2.3	36	3.2
SMD	28	1.3	36	2.5
Autres	120	10.5	121	12.7
Site primitif inconnu	45	2.1	50	4
Tous cancers	3276	268.7	4045	375.4