

Incidence par localisation sur la période 2012-2014

TABLE 1 – Incidence par localisation selon le sexe (moyenne sur la période)

Localisation	Femmes		Hommes	
	Cas	TIs	Cas	TIs
Lèvre - Cavité buccale - Pharynx	36	4.9	123	20.3
Oesophage	13	1.6	61	8.9
Estomac	25	2.9	64	8.2
Intestin grêle	9	1	14	2.1
Côlon - rectum	219	23.8	305	41
Foie	22	2.2	118	16.1
Vésicule et voie biliaire	12	1.3	10	1.1
Pancréas	66	6.7	67	9.6
Larynx	5	0.8	36	5.9
Poumon	110	16.4	319	49.4
Plèvre	4	0.5	7	0.9
Mélanome de la peau	67	10.5	70	11.4
Sein	594	98.2	6	0.8
Col de l'utérus	28	6.2	-	-
Corps de l'utérus	89	11.6	-	-
Ovaire	51	7.5	-	-
Prostate	-	-	553	80.3
Testicule	-	-	24	7.3
Vessie	26	2.1	113	14.2
Rein	44	6.4	95	14.1
Système nerveux central	24	3.2	35	7.4
Thyroïde	93	20.5	31	6.9
Lymphome de Hodgkin classique	11	3.8	11	3.4
LLC / lymph. lymphocytaire	22	2.3	37	5.3
LNH folliculaire	18	2.5	16	2.4
LNH diffus à grandes cellules B	23	3.3	29	4.7
LNH du manteau	1	0.1	6	0.8
LNH de la zone marginale	11	1.3	9	1.1
Myélome / Plasmocytome	23	2.4	29	4
LLP / Maladie de Waldenström	9	0.7	14	1.6
LNH T/NK à cellules matures	10	1.5	8	1.2
LNH / leucémie lymphoblastique	5	2.2	5	1.7
Leucémie aiguë myéloïde	17	2.2	18	2.8
Leucémie myéloïde chronique	5	0.7	4	1
Autres SMP chroniques	14	1.7	21	3.1
SMD	16	1.4	21	2.3
Autres	70	10.7	79	13.2
Site primitif inconnu	28	2.9	31	4
Tous cancers	1819	268.2	2391	358.4